



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی



پایه دهم ریاضی
۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱

دفترچه سؤال

مدت پاسخگویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد کل سؤال‌های آزمون: ۷۰ سؤال

عنوان	نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	شماره صفحه	زمان پاسخگویی (دقیقه)
اختصاصی	ریاضی (۱)	۲۰	۱-۲۰	۳	۳۵ دقیقه
	هندسه (۱)	۱۰	۲۱-۳۰	۶	۱۵ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۳۱-۵۰	۸	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۵۱-۷۰	۱۲	۲۵ دقیقه

طراحان

افشین خاصه خان - احمد مهرابی - میثم بهرامی - جویا - حمیدرضا کلاته جاری - محمد حمیدی - حمید علیزاده - علی سرآبادانی - احسان غنی زاده - سجاد داوطلب - رضا سیدنجفی - مصطفی محمدپور - سپهر قنوتی - محمد جلالی - بهرام حلاج - علی آزاد - اسماعیل میرزایی - امیرمحمودیان	ریاضی (۱)
علی ونکی فراهانی - اسماعیل میرزایی - پدram قلعه شاخانی - علی احمدی قزل دشت - محبوبه بهادری - نریمان فتح اللهی - امیرالمیر	هندسه (۱)
بهنام شاهی - محمدرضا شیروانی زاده - علیرضا رستم زاده - محمدرضا شریفی - حمیدرضا عسگری - سیده ملیحه میرصالحی	فیزیک (۱)
بهزاد تقی زاده - محمد حمیدی - علی جعفری - ایمان حسین نژاد - سجاد مجاهد - امیر حاتمیان - شهرام امیرمحمودی - هادی زمانیان - سهراب صادقی زاده - پرهام رحمانی - مرتضی زارعی - یاسر علیشانی	شیمی (۱)

گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئول درس و گزینشگر	گروه ویراستاری	مسئول درس مستندسازی
ریاضی (۱)	عاطفه خان محمدی	مهرداد ملوندی - فرشاد حسن زاده - علی مرشد	الهه شهبازی
هندسه (۱)	علی ونکی فراهانی	امیرحسین ابومحجوب - کریم کریمی - حنا عابدینی	سرژ یقیازاریان تبریزی
فیزیک (۱)	بهنام شاهی	بابک اسلامی - زهره آقامحمدی - امیرمحمودی انزایی	محمدرضا اصفهانی
شیمی (۱)	علی علمداری	سیدعلی موسوی فرد - ایمان حسین نژاد - متین قنبری	الهه شهبازی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	سیدعلی موسوی فرد
مسئول دفترچه	منا باجلان
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم
	مسئول دفترچه اختصاصی: الهه شهبازی
حروفنگاری و صفحه آرای	فاطمه علی یاری
ناظر چاپ	حمید عباسی

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین پلاک ۹۲۳ بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام) تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

۳۵ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله
صفحه‌های ۱ تا ۱۳

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟


چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۱- اگر $\mathbb{R}$ مجموعه مرجع باشد، مجموعه $Q - (Z - W)'$ برابر کدام است؟

(۱) مجموعه اعداد طبیعی (۲) مجموعه قرینه اعداد طبیعی

(۳) مجموعه اعداد حسابی (۴) مجموعه قرینه اعداد حسابی

۲- اگر $A = [-1, 2]$ و $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq 3 - 2x < 5\}$ و نمایش هندسی مجموعه C به صورت x باشد، با توجه به



نمودار ون زیر، قسمت هاشورخورده، چه مجموعه‌ای را نشان می‌دهد؟

(۱) $\{-1\} - [-2, 1]$ (۲) $[-2, 1]$

(۳) $[-2, -1]$ (۴) $[-2, -1]$

۳- اگر $(-2, a+4) \subseteq (a, 3a-1]$ باشد، چند مقدار صحیح برای a می‌توان در نظر گرفت؟

(۱) ۱ (۲) ۲

(۳) ۳ (۴) ۴

۴- کدام یک از مجموعه‌های زیر، مجموعه‌ای متناهی است؟

(۱) مجموعه همه اعداد گویای بین ۱ و ۲ (۲) مجموعه همه اعداد حسابی بزرگ‌تر از ۱۰۰۰

(۳) مجموعه همه اعداد صحیح کوچک‌تر از ۱۰۰ (۴) مجموعه همه اعداد حسابی کوچک‌تر از ۱۰۰۰۰

۵- اگر A یک مجموعه نامتناهی و B یک مجموعه متناهی باشد، آنگاه کدام مجموعه، لزوماً نامتناهی است؟

(۱) $B \cap A$ (۲) $B - A$

(۳) A' (۴) $A \cap B'$

۶- اگر $A \subset B \subset C$ باشد، کدام گزینه درست نیست؟ (U مجموعه مرجع است)

(۱) $A' \cap B' = U - B$ (۲) $A \cap B \cap C = A$

(۳) $C' \cap B' = U - B$ (۴) $A \cup B \cup C = U - C'$

۷- متمم مجموعه $(A \cap B) - C$ نسبت به مجموعه مرجع U ، کدام است؟

(۱) $(A \cap (B - C))'$ (۲) $(A - B) \cup (B - C)$

(۳) $(A' \cup B') - C'$ (۴) $A' \cup B' \cup C'$

۸- اگر $n(A \cup B') = ۱۴$ ، $n(A \cap B') = ۳$ و $n(A' - B) = ۵$ باشد، $n(A \cap B)$ کدام است؟

(۱) ۵ (۲) ۶

(۳) ۸ (۴) ۹

۹- از ۸۲ نفر مسافر یک هواپیما، ۲۵ نفر تاجرند و ۱۴ نفر برای اولین بار، سفر هوایی دارند. اگر ۹ نفر از تاجرین برای اولین بار سفر هوایی کرده باشند،

چند نفر نه تاجرند و نه برای اولین بار سفر هوایی کرده‌اند؟

(۱) ۳۹ (۲) ۴۸

(۳) ۴۵ (۴) ۵۲

۱۰- اجتماع دو مجموعه A و B دارای ۳۰ عضو است. مجموعه‌های $A - B$ و $A \cap B$ به ترتیب ۷ و ۵ عضو دارند. اگر از هر مجموعه، ۵ عضو برداشته

شود، از اشتراک آن‌ها ۲ عضو کم می‌شود، اجتماع مجموعه‌های جدید A و B چند عضو دارد؟

(۱) ۱۸ (۲) ۱۹

(۳) ۲۱ (۴) ۲۲

۱۱- به ازای چه محدوده‌ای از x ، عدد ۳ عضو بازه $[۳ + x, ۱ - ۲x]$ است ولی عدد ۴ عضو این بازه نیست؟

(۱) $[۰, ۲)$ (۲) $[۱, ۲)$

(۳) $[۰, ۱)$ (۴) $[۰, ۱) \cup (\frac{۵}{۲}, +\infty)$

۱۲- اگر $A = [-m + ۳, ۸]$ و $B = [-۲, n - ۲]$ باشد، به طوری که $A \cap B = [-۱, ۸]$ شود، چه شرط‌هایی برای n و m صادق است؟

(۱) $m \geq ۵$ ، $n = ۴$ (۲) $n \geq ۱۰$ ، $m = ۴$

(۳) $m = ۴$ ، $n \leq ۱۰$ (۴) $m \geq ۱۰$ ، $n = ۴$

۱۳- مجموعه‌های $A = \{۴^x \mid x \in \mathbb{W}\}$ و $B = \{x^۲ \mid x \in \mathbb{Z}\}$ مفروض‌اند. چه تعداد از مجموعه‌های $A \cap B$ ، $A \cup B$ ، $B - A$ و $A - B$ نامتناهی

هستند؟

(۱) ۱ (۲) ۲

(۳) ۳ (۴) ۴

۱۴- چه تعداد از مجموعه‌های زیر، متناهی هستند؟

الف) $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid \frac{1}{۱۰۰۰} < x < \frac{1}{۱۰۰}\}$ ب) $B = \{x^{۵۶} \mid x \in \mathbb{W}, x \leq ۴\}$

ج) $C = \{۵ - ۲x \mid x \in \mathbb{Z}, x < ۲\}$ د) $D = \{۸۱x^۲ - ۴ \mid x \in \mathbb{N}, -۴ - ۲x > -۱۰\}$

(۱) ۲ (۲) ۱

(۳) ۴ (۴) ۳

۱۵- چه تعداد از مجموعه‌های زیر نامتناهی هستند؟

«مجموعه اعداد اول یک رقمی، مجموعه اعداد طبیعی فرد، مجموعه سلول‌های عصبی مغز انسان، مجموعه تمام دایره‌های به مرکز مبدأ مختصات، مجموعه

کسره‌های مثبت با صورت یک، بازه $(0, 1)$ »

(۱) ۶ (۲) ۵

(۳) ۴ (۴) ۳

۱۶- مجموعه $A - [(A \cap B') \cup ((A - B) \cup (B - A))']$ برابر با کدام گزینه است؟ (A و B زیرمجموعه‌های مجموعه مرجع U هستند)

(۱) $A \cup B$ (۲) $A' \cup B$

(۳) $A' - B$ (۴) $A - B'$

۱۷- اگر A و B دو مجموعه باشند به طوری که $B \subseteq A'$ ، حاصل $(B - (B' \cap A)) \cup (B - A)$ کدام است؟

(۱) A (۲) A'

(۳) B (۴) B'

۱۸- مجموعه‌های A و B طوری مفروض‌اند که $n(A) = 4$ و $n(B) = 5$ و $n(A \cap B) = 3$ ؛ اگر مجموعه مرجع U دارای ۱۰ عضو باشد، در

این صورت تعداد زیرمجموعه‌های $A' \cup B'$ کدام است؟

(۱) ۴۹ (۲) ۱۲۸

(۳) ۷ (۴) ۶۴

۱۹- یک دبیرستان دو رشته ریاضی و تجربی دارد. سال گذشته ۶۵ نفر از این دبیرستان کنکور دادند که ۱۲ درصد دانش‌آموزان ریاضی رتبه زیر ۱۰۰۰

کسب کردند. اگر تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ در رشته تجربی ۲ نفر بیشتر از تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ در رشته ریاضی باشد و تعداد کل

دانش‌آموزان ریاضی شرکت کننده در کنکور ۵ برابر تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ رشته تجربی بوده باشد، چند نفر از این دبیرستان رتبه زیر ۱۰۰۰


کسب کرده‌اند؟

(۱) ۶ (۲) ۸

(۳) ۱۰ (۴) ۱۲

۲۰- ده درصد از دانش‌آموزان یک کلاس ۴۰ نفری، هیچ‌کدام از ورزش‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال را دنبال نمی‌کنند. طبق نمودار ون زیر، چند نفر از

این کلاس، ورزش بسکتبال را دنبال می‌کنند؟



(۱) ۱۱ (۲) ۱۴

(۳) ۱۰ (۴) ۱۳

۱۵ دقیقه

ترسیم‌های هندسی و استدلال

صفحه‌های ۹ تا ۱۶


هندسه (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس هندسه (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۲۱- با توجه به شکل زیر، چند نقطه می‌توان یافت که از نقطه A به فاصله ۴ واحد و از خط d به فاصله ۲ واحد باشد؟



۱ (۲)

۱) صفر

۳ (۴)

۲) ۳

۲۲- عمودمنصف‌های دو وتر غیرموازی از دایره C را رسم کرده‌ایم، در این صورت عمودمنصف‌ها ...

(۲) در نقطه‌ای به جز مرکز دایره و درون دایره متقاطع هستند.

(۱) در مرکز دایره متقاطع خواهند بود.

(۴) متقاطع نیستند.

(۳) روی محیط دایره متقاطع هستند.

۲۳- در کدام یک از عبارت‌های زیر برای ترسیم‌های به روش کتاب درسی تعداد کمان‌های موردنیاز با سایرین متفاوت است؟


(۱) رسم نیمساز یک زاویه

(۲) رسم خط موازی با یک خط از نقطه‌ای خارج از آن خط

(۳) رسم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای غیرواقع بر آن

(۴) رسم خط عمود بر یک خط از نقطه‌ای واقع بر آن

۲۴- نقطه P روی عمودمنصف پاره‌خط AB است، به‌طوری که $PB = a - 3b$ و $PA = 2a + b$. اگر $AM = a - b + 1$ و $BM = 5a + 2b - 2$ باشد، حاصل $a + b$ کدام است؟




۲ (۲)

۱) ۱

۴ (۴)

۳) ۳

۲۵- در چهارضلعی ABCD، قطر AC به طول $x + 4$ نیمساز زاویه A است. اگر $CD = x + 2$ و $AD = 4$ باشد، آنگاه محیط چهارضلعی کدام است؟



۱۲ (۱)

۱۴ (۲)

۱۶ (۳)

۱۸ (۴)

۲۶- در مثلث قائم‌الزاویه ABC ($\hat{A} = 90^\circ$) اندازه زاویه C برابر 44° است. اگر نیمساز زاویه B ضلع AC را در نقطه M قطع کند و MN عمود بر BC

باشد، اندازه زاویه $\hat{MAN}$ چند درجه است؟ (نقطه N روی ضلع BC است)

۲۷ (۱) ۴۶ (۲)

۲۳ (۳) ۵۴ (۴)

۲۷- پاره‌خط AB به اندازه ۴۰ واحد مفروض است. اگر دایره‌ای به مرکز نقطه A و شعاع ۲۹ واحد، عمودمنصف پاره‌خط AB را در نقاط M و N قطع کند،

اندازه MN کدام است؟

۴۰ (۱) ۲۱ (۲)

۴۲ (۳) ۳۰ (۴)


۲۸- در مثلث ABC ، عمودمنصف ضلع BC ، ضلع AC را به نسبت ۱ به ۳ در نقطه D قطع کرده است. اگر $AB = 10$ باشد، محیط مثلث ABD کدام

می‌تواند باشد؟ ($AD < DC$)

۱۲ (۱) ۱۸ (۲)

۲۴ (۳) ۳۲ (۴)

۲۹- در مثلث قائم‌الزاویه مقابل، مساحت مثلث $\sqrt{2}$ برابر مجموع اضلاع قائمه است. طول نیمساز داخلی زاویه قائمه کدام است؟ (AD نیمساز داخلی زاویه A می‌باشد).



۴ (۱) $2\sqrt{2}$ (۲)

۲ (۳) $4\sqrt{2}$ (۴)

۳۰- در مثلث ABC ارتفاع AH ، نیمساز زاویه B را در نقطه D قطع کرده است. اندازه ضلع AB کدام است؟ ($AD = BD = 6, DH = 3$)

۳ (۱) $6\sqrt{3}$ (۲)

۸ (۳) $9\sqrt{3}$ (۴)

۳۰ دقیقه

فیزیک و اندازه‌گیری

صفحه‌های ۱ تا ۱۳

فیزیک (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۳۱- در مدل‌سازی سقوط یک برگ از درخت ... مدل‌سازی سقوط یک چتر باز، اثر نیروی مقاومت هوا را

(۱) مانند- در نظر می‌گیریم. (۲) مانند- در نظر نمی‌گیریم.

(۳) برخلاف- در نظر می‌گیریم. (۴) برخلاف- در نظر نمی‌گیریم.

۳۲- مدل اتمی‌ای که قبل از مدل سیاره‌ای ارائه شد، مدل ... نام داشت که توسط ... ارائه شد.

(۱) ابرالکترونی - شرودینگر (۲) ابر الکترونی - رادرفورد

(۳) هسته‌ای - رادرفورد (۴) هسته‌ای - بور

۳۳- چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟

الف) ویژگی آزمون‌پذیری، نقطه ضعف دانش فیزیک نیست.

ب) نتایج آزمایش‌های جدید می‌تواند منجر به بازنگری در مدل یا نظریه‌ای شده و حتی نظریه‌ای جدید را جایگزین کند.

پ) در فیزیک نقش آزمایش و مشاهده از نقش تفکر نقادانه مهم‌تر نیست.

ت) فیزیک‌دانان گستره محدودی از پدیده‌ها را بررسی می‌کنند، بنابراین لازم است این قوانین، مدل‌ها و نظریه‌ها توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرد.

(۱) ۱ (۲) ۲

(۳) ۳ (۴) ۴

۳۴- کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

(۱) $202 \text{ km} = 2 / 02 \times 10^{14} \text{ nm}$ (۲) $0 / 4823 \mu\text{s} = 4 / 823 \times 10^{-12} \text{ Ms}$

(۳) $9 \text{ cm}^2 = 9 \times 10^2 \text{ mm}^2$ (۴) $5 \text{ m}^3 = 5 \times 10^3 \text{ dm}^3$

۳۵- کدام جمله به لحاظ فیزیکی کامل است؟

(۱) یک توده هوا با سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت در حرکت است.

(۲) دو توپ با تندی‌های ۵ متر بر ثانیه و ۱۰ متر بر ثانیه در یک راستا در حال حرکت هستند.

(۳) دو نیرو در جهت‌های مخالف به یک جسم وارد می‌شوند.

(۴) گلوله توپی با سرعت اولیه ۲۰ متر بر ثانیه و با زاویه ۳۵ درجه نسبت به افق شلیک می‌شود.

۳۶- اگر بدانیم که انرژی جنبشی یک جسم از رابطه $K = \frac{1}{2}mv^2$ محاسبه می‌شود، در این صورت واحد اندازه‌گیری انرژی جنبشی برحسب یکاهای

اصلی SI در کدام گزینه درست بیان شده است؟ (m جرم جسم و v تندی جسم است).

J (۲)

$\frac{kg \cdot m}{s^2}$ (۱)

$kg^2 \cdot m$ (۴)

$\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ (۳)

۳۷- شدت روشنایی، یک کمیت ... است و علاوه بر عدد، دارای ... نیز می‌باشد.


(۲) برداری - یکا

(۱) نرده‌ای - جهت

(۴) فرعی - جهت

(۳) اصلی - یکا

۳۸- مساحت مثلث شکل مقابل چند سانتی‌متر مربع است؟ (شکل با مقیاس رسم نشده است).



$7/5 \times 10^5$ (۲)

$1/5 \times 10^6$ (۱)

$1/5 \times 10^5$ (۴)

$7/5 \times 10^1$ (۳)

۳۹- فرض کنید در یک روز خورشید در ساعت ۶/۰۵ صبح طلوع و در ۷/۳۵ عصر غروب می‌کند. زمان بین طلوع و غروب خورشید با نمادگذاری

علمی چند سانتی‌ثانیه است؟

$48/6 \times 10^4$ (۲)

4860000 (۱)

$4/86 \times 10^6$ (۴)

$4/86 \times 10^2$ (۳)

۴۰- ارتفاع آب یک برکه بر اثر تبخیر هر هفته به طور متوسط $24 \text{ cm} / 30$ پایین می‌رود، آهنگ کاهش ارتفاع آب برکه چند $\frac{\mu\text{m}}{\text{ms}}$ است؟

(۲) 2×10^{-4}

(۱) 2×10^{-3}

(۴) 5×10^{-4}

(۳) 5×10^{-3}

فیزیک (۱) - سوالات آشنا

۴۱- فردی از پشت‌بام یک ساختمان بلند، یک برگه کاغذ را رها می‌کند. اگر نسیم آرامی در حال وزیدن باشد، کدامیک از فرض‌های زیر جهت مدل‌سازی

و تحلیل حرکت کاغذ، درست است؟

(۲) وزش نسیم را نادیده می‌گیریم.

(۱) از اثر مقاومت هوا صرف‌نظر می‌کنیم.

(۴) کاغذ را به صورت یک جسم نقطه‌ای در نظر می‌گیریم.

(۳) وزن کاغذ با تغییر فاصله از مرکز زمین تغییر نمی‌کند.

۴۲- حاصل کدامیک از رابطه‌های فیزیکی زیر یک کمیت اصلی در SI می‌باشد؟

(۴) $\frac{\text{انرژی}}{\text{توان}}$

(۳) سرعت $\times$ فشار

(۲) $\frac{\text{نیرو}}{\text{انرژی}}$

(۱) فشار $\times$ نیرو

۴۳- اگر یکای طول را به صورت طول و جب دست هر شخص معرفی کنیم، مهم‌ترین مشکل این انتخاب چیست؟

(۴) بزرگ بودن

(۳) کوچک بودن

(۲) تغییرپذیر بودن

(۱) قابل دسترس نبودن

۴۴- مکعب‌های کوچک یکسانی داریم که می‌خواهیم با آن‌ها جعبه‌های بزرگی را پر کنیم. ابعاد مکعب‌های کوچک $2 \text{ dm} \times 60 \text{ mm} \times 4 \text{ cm}$ است. با

چه تعداد از این مکعب‌ها می‌توان جعبه بزرگی به ابعاد $4 \text{ m} \times 6 \text{ dm} \times 4 \text{ m}$ دگامتر $\times 4 \times 10^{-5}$ مگامتر را پر کرد؟

(۴) 5×10^6

(۳) 5×10^2

(۲) 2×10^7

(۱) 2×10^3

۴۵- حاصل عبارت $3 \times 10^6 \mu\text{m}^2 + 4 \text{ cm}^2 + 4 \times 10^{-3} \text{ dm}^2$ کدام است؟

(۴) $44 / 3 \text{ cm}^2$

(۳) $8 / 3 \text{ cm}^2$

(۲) 443 mm^2

(۱) 803 mm^2

۴۶- مخزنی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد $5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2\text{cm}$ از یک مایع با چگالی $2500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ به طور کامل پر شده است. اگر این مایع با آهنگ ثابت

$5 \frac{\text{dg}}{\text{min}}$ از مخزن خارج شود، پس از چند ثانیه از آغاز خروج مایع، مخزن به طور کامل تخلیه می شود؟

(۱) 9×10^3 (۲) 10^4

(۳) 9×10^4 (۴) 10^6

۴۷- کدام یک از اعداد با رعایت شیوه نمادگذاری علمی، صحیح نوشته نشده است؟

(۱) $5280 = 5 / 280 \times 10^3$ (۲) $0.00215 = 2 / 15 \times 10^{-3}$

(۳) $0.0001 = 1 \times 10^{-4}$ (۴) $0.00000101 = 10 / 1 \times 10^{-7}$

۴۸- فاصله بین دو نقطه برابر با 125Tm است. این فاصله بر اساس نمادگذاری علمی و بر حسب میکرومتر کدام است؟

(۱) $12 / 5 \times 10^{15}$ (۲) $1 / 25 \times 10^{16}$ (۳) $1 / 25 \times 10^{18}$ (۴) $1 / 25 \times 10^{20}$

۴۹- رابطه میان چهار کمیت a ، b ، c و d به صورت $a = \frac{b^3 c}{d^2}$ است. اگر یکای کمیت های b ، c و d به ترتیب kN ، MPa و GJ باشد،

کمیت a کدام است؟

(۱) 10^{-3}Pa^2 (۲) 10^{-5}W^2 (۳) 10^3Pa (۴) 10^{-3}J^2

۵۰- کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟

(۱) یکای هر کمیت، مقدار معین و ثابتی از آن کمیت است.

(۲) در عمل برای همه کمیت های فیزیکی یکای مستقلی تعریف می شود.

(۳) کمیت های طول، زمان، جرم، جریان الکتریکی و دما همگی در **SI** اصلی هستند.

(۴) یکای تعریف شده برای یک کمیت، باید در دسترس باشد.

۲۵ دقیقه

کیهان زادگاه الفبای

هستی

صفحه‌های ۱ تا ۱۳

شیمی (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس شیمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۵۱- برای یافتن پاسخی جامع و کامل برای سؤال ... باید به ... مراجعه کرد.

الف) جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟

ب) هستی چگونه پدید آمده است؟

پ) پدیده‌های طبیعی چرا و چگونه رخ می‌دهند؟

(۲) پ - بینش خود در پرتو آموزه‌های الهی

(۱) ب - چارچوب اعتقادی و دانش‌های علوم تجربی

(۴) الف - چارچوب اعتقادی و دانش‌های علوم تجربی

(۳) ب - چارچوب اعتقادی و بینش خود در پرتو آموزه‌های الهی

۵۲- ایزوتوپ‌های یک عنصر در چند مورد از موارد زیر، شرایط مشابهی دارند؟

• تعداد الکترون‌ها • پایداری • واکنش‌پذیری • چگالی

(۴) ۱

(۳) ۲

(۲) ۳

(۱) ۴

۵۳- کدام مطلب درست است؟

(۱) اولین ذرات به وجود آمده بعد از مه‌بانگ، هیدروژن و هلیوم هستند.

(۲) نوع و میزان فراوانی عنصرها در سیاره زمین و مشتری نشان می‌دهند که عنصرها به صورت همگون در جهان هستی پراکنده شده‌اند.

(۳) مقدار انرژی مبادله شده در واکنش‌های شیمیایی در پدیده‌های طبیعی پیرامون ما اغلب مشابه مقدار انرژی آزاد شده در واکنش‌های هسته‌ای است.

(۴) انرژی گرمایی و نور خیره کننده خورشید به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیوم در واکنش‌های هسته‌ای است.

۵۴- کدام عبارت در مورد عنصر تکنسیم نادرست است؟

(۱) در تصویربرداری غده تیروئید اندازه یون تکنسیم مشابه اندازه یون یدید (I^-) است.

(۲) این عنصر در دوره ۵ و گروه ۷ جدول تناوبی جای دارد و رادیوایزوتوپ $^{99}_{43}Tc$ آن ناپایدار است.

(۳) همه تکنسیم موجود در جهان به‌طور مصنوعی و با استفاده از واکنش‌های هسته‌ای ساخته می‌شود.

(۴) از آنجا که نیم‌عمر تکنسیم کم است، بسته به نیاز آن را با یک مولد هسته‌ای تولید و سپس مصرف می‌کنند.

۵۵- عبارت کدام یک از گزینه‌های زیر، نادرست است؟

(۱) فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ با گذر از کنار سیاره‌هایی مانند مریخ و زهره شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را تهیه کردند.

(۲) شناسنامه تهیه شده توسط فضاپیماهای وویجر ۱ و ۲ شامل نوع عنصرهای سازنده و ترکیب‌های شیمیایی در اتمسفر آن‌ها و ترکیب درصد این مواد است.

(۳) بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی سیاره‌ها و مقایسه آن با عناصر سازنده خورشید می‌تواند به درک چگونگی تشکیل عنصرها کمک کند.

(۴) نوع و میزان فراوانی عنصرها در سیاره‌های مختلف منظومه خورشیدی با یکدیگر متفاوت است.

۵۶- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

(الف) سیاره مشتری بیشتر از جنس گاز و سیاره زمین بیشتر از جنس سنگ است.

(ب) درون ستاره‌ها برخلاف خورشید واکنش‌های هسته‌ای رخ می‌دهد؛ واکنش‌هایی که در آن‌ها از عنصرهای سبک‌تر عنصرهای سنگین‌تر ایجاد می‌گردد.

(پ) درصد فراوانی اکسیژن در سیاره مشتری بیشتر از زمین است.

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۵۷- چند مورد از ویژگی‌های زیر در ارتباط با تکنسیم ($^{99}_{43}\text{Tc}$) به درستی بیان شده است؟

• نگهداری آسان آن • مشابهت اندازه یون تکنسیم به یون یدید • ماندگاری زیاد

• داشتن هسته ناپایدار • نیاز به واکنشگاه‌های هسته‌ای برای تولید آن • نیم‌عمر کم

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۵۸- چه تعداد از روندهای زیر، الگوی درستی را نشان می‌دهند؟

(الف) سحابی‌ها → هلیوم → هیدروژن → ذره‌های زیراتمی → مه‌بانگ

(ب) عنصرهایی مانند کربن و لیتیم → عنصرهایی مانند آهن و طلا → هیدروژن

(پ) هیدروژن و هلیوم → سحابی‌ها → ذره‌های زیراتمی → مه‌بانگ

(ت) پراکندگی عنصرها در فضا → انفجار → ستاره‌ها → سحابی‌ها

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵۹- کدام گزینه در ارتباط با هشت عنصر فراوان در سیاره‌های زمین و مشتری نادرست است؟

(۱) عناصر مشترک بین زمین و مشتری در بین ۸ عنصر فراوان، اکسیژن و گوگرد هستند.

(۲) در بین ۸ عنصر فراوان زمین برخلاف مشتری گاز نجیب وجود ندارد.

(۳) فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری، دارای ۳ ایزوتوپ طبیعی است.

(۴) در میان ۸ عنصر فراوان سیاره زمین دو عنصر در دما و فشار اتاق به حالت گازی قرار دارد.

۶۰- چند مورد از مطالب زیر، نادرست هستند؟

• همه هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون به عدد اتمی آن‌ها برابر یا بیش از ۱/۵ باشد، ناپایدار هستند.

• حدود ۶۰٪ عناصر شناخته شده در طبیعت وجود دارند.

• پسماند راکتورهای اتمی خاصیت پرتوزایی دارد و خطرناک است. از این رو دفع آن‌ها از جمله چالش صنایع هسته‌ای است.

• طی فرایند غنی‌سازی، مقدار ایزوتوپ ^{235}U در مخلوط ایزوتوپ‌های طبیعی این عنصر، افزایش می‌یابد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۶۱- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست بیان شده‌اند؟

- الف) پس از مهیائنگ و پدید آمدن ذره‌های زیراتمی، با گذشت زمان و افزایش دما گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شده، متراکم شدند و سحابی را به وجود آوردند.
 ب) به واکنش‌هایی که در آن‌ها از عناصر سبک‌تر، عناصر سنگین‌تر به وجود می‌آیند، واکنش هسته‌ای می‌گویند.
 پ) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می‌شود عناصر تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شوند.
 ت) سحابی‌ها سبب پیدایش ستاره‌ها و کهکشان‌ها شدند.

(۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴) صفر

۶۲- چه تعداد از عبارت‌های پیشنهادی، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کنند؟

«در جدول تناوبی امروزی ...»

- الف) تعداد عناصر گروه هجدهم جدول دوره‌ای بیشتر از گروه دوم است.
 ب) تعداد عنصرهای دوره دوم با تعداد عنصرهای دوره سوم برابر و چهار برابر تعداد عنصرهای دوره اول است.
 پ) عناصر ^{34}Se و ^{19}K در یک دوره و عناصر ^{4}Be و ^{20}Ca در یک گروه قرار دارند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۶۳- کدام موارد زیر، درباره جدول تناوبی عنصرها، درست است؟

- الف) خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرهایی که در یک ستون جدول تناوبی قرار دارند، می‌تواند مشابه باشد.
 ب) هر خانه از جدول تناوبی، شامل اطلاعاتی مانند نام، نماد شیمیایی، عدد اتمی و جرم اتمی دقیق آن عنصر است.
 پ) در همه عناصر جدول تناوبی، تعداد نوترون‌ها بزرگتر یا برابر با تعداد پروتون آن‌ها می‌باشد.
 ت) نماد شیمیایی عناصر منیزیم، فسفر و آهن به صورت Mn ، P و Fe است.

(۱) (الف) و (پ) (۲) (ب) و (ت) (۳) (الف)، (پ) و (ت) (۴) فقط (الف)

۶۴- اگر ۴۸ درصد ذرات باردار موجود در یون فرضی M^{2+} مربوط به الکترون‌ها باشد و $37/5$ درصد کل ذرات زیراتمی این یون مربوط به نوترون‌ها باشد، تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در این یون چقدر است؟

(۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۴ (۴) ۳

۶۵- چند مورد از عبارت‌های زیر، در ارتباط با تومورهای سرطانی و تشخیص آن با استفاده از گلوکز نشان‌دار شده درست است؟

- الف) سوخت اصلی یاخته‌ها برای ادامه فعالیت و تولید انرژی، گلوکز است.
 ب) توده سرطانی، نوعی توده سلولی است که رشد و تکثیر غیرعادی دارد.
 پ) تجمع گلوکز نشان‌دار، همانند گلوکز معمولی در بافت سرطانی بیشتر از بافت‌های سالم است.
 ت) سلول حاوی ماده پرتوزا توسط آشکارساز پرتو قابل تشخیص و شناسایی است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴



ریاضی (۱)

۱- گزینه «۲»

(افشین فاضله‌فان)

W و Z زیرمجموعه Q هستند پس $Z - W$ نیز زیرمجموعه Q است. یعنی:

$$Q - (Z - W)' = Q \cap (Z - W) = Z - W = \{..., -2, -1\}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲ و ۳ کتاب درسی)

۲- گزینه «۱»

(امیر مهرابی)

$$1 \leq 3 - 2x < 5 \Rightarrow -2 \leq -2x < 2 \Rightarrow -1 < x \leq 1$$

$$(C - A) \cup (B \cap C) = \text{قسمت هاشورخورده}$$

$$= ((-2, 1] - [-1, 2]) \cup ((-1, 1] \cap (-2, 1])$$

$$= (-2, -1) \cup (-1, 1] = (-2, 1] - \{-1\}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ و ۵ تا ۸ کتاب درسی)

۳- گزینه «۲»

(میثم بهرامی‌پویا)

۴ شرط را باید در نظر بگیریم:

$$1) a < 3a - 1 \Rightarrow 2a > 1 \Rightarrow a > \frac{1}{2}$$

$$2) -2 < a + 4 \Rightarrow a > -6$$

$$3) a \geq -2$$

$$4) 3a - 1 < a + 4 \Rightarrow 2a < 5 \Rightarrow a < \frac{5}{2}$$

$$\text{اشتراک: } \frac{1}{2} < a < \frac{5}{2}$$

بنابراین a می‌تواند مقادیر صحیح ۱ و ۲ باشد.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

۴- گزینه «۴»

(ممیرضا کلاته‌پاری)

مجموعه همه اعداد حسابی کوچک‌تر از ۱۰۰۰۰ به صورت $\{0, 1, 2, \dots, 9999\}$

می‌باشد که مجموعه‌ای متناهی است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

۵- گزینه «۴»

(مهمیر ممیری)

مجموعه‌های $B \cap A$ و $B - A$ لزوماً متناهی هستند. در مورد A' ، اگر فرض

کنیم A برابر مجموعه مرجع U باشد، آنگاه $A' = \emptyset$ می‌شود که یک مجموعه


متناهی است. مجموعه $A \cap B' = A - B$ لزوماً یک مجموعه نامتناهی است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۱۰ کتاب درسی)

۶- گزینه «۳»

(همیر علینازده)

با توجه به نمودار ون داریم:




$$1) A' \cap B' = (A \cup B)' = B' = U - B$$

$$2) A \cap B \cap C = A$$

$$3) C' \cap B' = (C \cup B)' = C' \neq U - B = B'$$

$$4) A \cup B \cup C = C = U \cap C = U - C'$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)



$$\begin{aligned} n(A \cap B') &= n(A - B) = 3 \\ n(A' - B) &= n(A' \cap B') = n((A \cup B)') = 5 \\ n(A \cup B') &= 3 + x + 5 = 14 \Rightarrow n(A \cap B) = x = 6 \end{aligned}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۳ کتاب درسی)

(افسان غنی‌زاده)

۹- گزینه «۴»

اولین سفر هوایی: B و تاجر: A

$$n(U) = 82, n(A) = 25, n(B) = 14, n(A \cap B) = 9$$

تعداد افرادی که نه تاجرند و نه برای اولین بار سفر هوایی کرده‌اند


$$\begin{aligned} &= n(A' \cap B') = n((A \cup B)') = n(U) - n(A \cup B) \\ &= n(U) - n(A) - n(B) + n(A \cap B) \\ &= 82 - 25 - 14 + 9 = 52 \end{aligned}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(سیار دواطلب)

۱۰- گزینه «۴»

حالت اول:




حالت دوم: وقتی ۲ عضو از اشتراک A و B کم می‌شود، از هر یک از مجموعه‌های

A - B و B - A، ۳ عضو کم می‌شود:

(علی سرآبادانی)


۷- گزینه «۱»

با توجه به نمودار ون داریم:




$(A \cap B) - C$


$((A \cap B) - C)'$




$1) (A \cap (B - C))'$



$2) (A - B) \cup (B - C)$



$3) (A' \cup B') - C'$



$4) A' \cup B' \cup C' = (A \cap B \cap C)'$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

(میثم بهرامی‌پویا)

۸- گزینه «۲»


مقادیر داده شده را در نمودار ون می‌نویسیم:

$$۱) -m + 3 \leq 8 \Rightarrow m \geq -5$$

$$۲) -2 \leq n - 2 \Rightarrow n \geq 0$$

حال با توجه به اشتراک دو مجموعه A و B داریم:

$$\begin{cases} -m + 3 = -1 \\ n - 2 \geq 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 4 \\ n \geq 10 \end{cases}$$



(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(مبسطی ممبرپور)

۱۳- گزینه «۳»

$$A = \{1, 4, 16, 64, \dots\} \text{ و } B = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots\} \Rightarrow A \subseteq B$$

$$A - B = \emptyset \text{ نامتناهی و مجموعه } B - A, A \cup B = B, A \cap B = A \text{ مجموعه‌های}$$

متناهی است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

(سپهر قنوازی)

۱۴- گزینه «۱»

الف) نامتناهی است زیرا بی‌شمار عدد گویا بین ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ وجود دارد.

$$B = \{0, 1, 2^{56}, 3^{56}, 4^{56}\} \text{ متناهی است زیرا}$$


$$C = \{3, 5, 7, 9, \dots\} \text{ نامتناهی است زیرا}$$

$$D = \{77, 320\} \text{ متناهی است زیرا}$$

بنابراین دو مجموعه، متناهی هستند.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

U



$$\Rightarrow n(A \cup B) = 22$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(رضا سیرنقی)

۱۱- گزینه «۳»

ابتدا شرط بازه را چک می‌کنیم:

$$2x - 1 < x + 3 \Rightarrow x < 4 \quad (۱)$$

از طرفی باید داشته باشیم:


$$2x - 1 < 3 \leq x + 3 \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x < 2 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\xrightarrow[\text{اشتراک}]{(۲), (۱)} 0 \leq x < 2 \quad *$$

عدد ۴ نباید عضو بازه باشد، بنابراین:

$$4 \leq 2x - 1 \text{ یا } x + 3 < 4 \Rightarrow x \geq \frac{5}{2} \text{ یا } x < 1 \quad (۳)$$

اشتراک * و (۳) محدوده X را مشخص می‌کند:



$$x \in [0, 2)$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(رضا سیرنقی)

۱۲- گزینه «۲»

ابتدا شرط بازه‌ها را چک می‌کنیم:

۱۵- گزینه «۳»

(مهمبر یلالی)

مجموعه‌های متناهی: مجموعه اعداد اول یک رقمی، مجموعه سلول‌های عصبی مغز انسان


مجموعه‌های نامتناهی: مجموعه اعداد طبیعی فرد، مجموعه تمام دایره‌های به مرکز مبدأ مختصات، مجموعه کسره‌های مثبت با صورت یک، بازه (۰,۱)

(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب درسی)

۱۶- گزینه «۳»

(بهرام علاج)

نمودار ون را رسم کرده و ناحیه‌ها را شماره‌گذاری می‌کنیم:



$\Rightarrow$ حاصل مجموعه داده شده $= (\{1\} \cup \{2, 4\}) - \{1, 2\} = \{4\}$

$= (A \cup B)' = A' \cap B' = A' - B$

(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

۱۷- گزینه «۳»

(علی آزار)

$$\left. \begin{array}{l} B - A = B \cap A' \\ B \subseteq A' \end{array} \right\} \Rightarrow B - A = B$$

$$\left. \begin{array}{l} B - (B' \cap A) = B \cap (B' \cap A)' = B \cap (B \cup A') \\ B \subseteq A' \end{array} \right\} \Rightarrow B \cap \underbrace{(B \cup A')}_{A'} = B \cap A' = B \Rightarrow (B - (B' \cap A)) \cup (B - A) = B \cup B = B$$

(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب درسی)

۱۸- گزینه «۲»

(اسماعیل میرزایی)

$$A' \cup B' = (A \cap B)' \Rightarrow n(A \cap B)' = n(U) - n(A \cap B) = 10 - 3 = 7$$

تعداد زیرمجموعه‌ها برابر با 2^7 است.

(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۸ تا ۱۳ کتاب درسی)

۱۹- گزینه «۲»

(امیر مهمبریان)

تعداد کل دانش‌آموزان ریاضی شرکت‌کننده در کنکور از این مدرسه را x در نظر

می‌گیریم. $\frac{12}{100}x$ تعداد رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ رشته ریاضی و $\frac{x}{5}$ تعداد رتبه‌های

زیر ۱۰۰۰ رشته تجربی است.

طبق فرض داریم:

$$\frac{x}{5} = \frac{12}{100}x + 2 \times 100 \Rightarrow 20x = 12x + 200 \Rightarrow 8x = 200 \Rightarrow x = 25$$

$$1000 \text{ رتبه‌های زیر } 1000 = \frac{12}{100}x + \frac{x}{5} = \frac{12}{100} \times 25 + \frac{25}{5} = 3 + 5 = 8$$

(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

۲۰- گزینه «۱»

(عمیر علیزاده)

A = فوتبال، B = والیبال، C = بسکتبال

$$\begin{aligned} n((A \cup B \cup C)') &= \frac{10}{100} \times 40 = 4 \Rightarrow n(A \cup B \cup C) = 40 - 4 = 9 + x + 6 + x - 2 + 2 \Rightarrow 36 = 16 + 2x \\ \Rightarrow x &= 10 \\ n(C) &= x - 2 + 3 = 11 \end{aligned}$$


(مهمبر، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

هندسه (۱)

۲۱- گزینه «۳»


(علی ونگلی فراهانی)

مجموعه نقاطی که از خط d به فاصله ۲ باشند، دو خط موازی با d و به فاصله ۲ از آن می باشد.




مجموعه نقاطی که فاصله آن ها از A برابر ۴ باشد، دایره ای به مرکز A و شعاع ۴

است.



نقاط برخورد دایره C و خطوط L و L' پاسخهای مسئله می باشد.



نقاط D و D' پاسخهای مسئله است. پس دو نقطه با این مشخصات وجود دارد.

(ترسیم های هندسی و استرلا، صفحه های ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)


۲۲- گزینه «۱»

(اسماعیل میرزایی)

مرکز دایره از تمام نقاط واقع بر دایره به یک فاصله است، پس عمودمنصف هر وتر

دلخواه دایره از مرکز دایره عبور می کند و در نتیجه محل برخورد عمودمنصف های دو

وتر غیرموازی در دایره، مرکز دایره است.



(ترسیم های هندسی و استرلا، صفحه ۱۶ کتاب درسی)

۲۳- گزینه «۲»

(پدram قلعه شافانی)

برای رسم نیمساز یک زاویه به ۳ کمان، برای رسم خط موازی با یک خط از نقطه ای

خارج از آن خط به ۶ کمان برای رسم خط عمود بر یک خط از یک نقطه چه در خارج و

چه واقع بر آن خط به ۳ کمان نیاز داریم.

(ترسیم های هندسی و استرلا، صفحه های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی)

۲۴- گزینه «۱»

(علی احمدی قزل دشت)

می دانیم هر نقطه روی عمودمنصف از دو سر پاره خط به یک فاصله است. بنابراین

$$PB = PA \text{ و } AM = BM \text{ پس } AB \text{ وسط } M \text{ است}$$

$$\begin{cases} 3a + b = a - 2b \Rightarrow \\ a - b + 1 = 5a + 4b - 2 \Rightarrow \end{cases} \begin{cases} 2a + 3b = 0 \\ 4a + 5b = 3 \end{cases}$$

$$a = 2 \quad b = -1 \quad a + b = 1$$

(ترسیم های هندسی و استرلا، صفحه های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی)

۲۵- گزینه «۲»

(علی احمدی قزل دشت)


چون AC نیمساز زاویه A است. بنابراین $AB = AD$ و $BC = CD$. در

مثلث قائم الزاویه ACD داریم:

$$\begin{aligned}(x+2)^2 + 4^2 &= (x+4)^2 \\ \Rightarrow x^2 + 4x + 4 + 16 &= x^2 + 8x + 16 \\ \Rightarrow x &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{cases} AB = AD = 4 \\ BC = CD = x+2 \xrightarrow{x=1} = 3 \end{cases}$$

محيط = $4 + 4 + 3 + 3 = 14$




(ترسیم‌های هندسی و استرلال، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

۲۶- گزینه «۳»

(مقبوبه بهادری)

چون نقطه M روی نیمساز زاویه B قرار دارد.



بنابراین $MA = MN$ یعنی مثلث $\triangle AMN$ متساوی الساقین است و در نتیجه


$\hat{M}\hat{A}N = \hat{M}\hat{N}A$. برای زاویه خارجی در مثلث AMN داریم:

$$\begin{aligned}\hat{C}\hat{M}\hat{N} = x + x = 90^\circ - 44^\circ = 46^\circ \Rightarrow 2x &= 46 \\ \Rightarrow x &= 23^\circ\end{aligned}$$

(ترسیم‌های هندسی و استرلال، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

۲۷- گزینه «۳»

(نریمان فتح‌اللهی)



$$AO = OB = 20$$

$$\begin{aligned}OM^2 &= AM^2 - AO^2 = 29^2 - 20^2 = 841 - 400 = 441 \\ \Rightarrow OM &= 21\end{aligned}$$

دو مثلث AOM و BON به حالت وتر و یک ضلع هم‌نهشت هستند ($AM = BM$)

و AC مشترک، پس $OM = ON$ و در نتیجه داریم:

$$MN = 2OM = 2 \times 21 = 42$$

(ترسیم‌های هندسی و استرلال، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی)

۲۸- گزینه «۳»

(امیر مالمیر)

نقطه D روی عمودمنصف ضلع BC قرار دارد و می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف

یک پاره‌خط از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است یعنی:

$$BD = DC \Rightarrow BD = 3x$$

طبق نامساوی مثلثی در ABC داریم:


$$\begin{aligned}BD - AD &< AB < BD + AD \\ \Rightarrow 3x - x < 10 < 3x + x &\Rightarrow 2x < 10 < 4x \\ \Rightarrow 2/5 < x < 5 \xrightarrow{\times 4} 10 &< 4x < 20\end{aligned}$$

$$\triangle ABD \text{ محیط} = AB + BD + AD = 10 + 3x + x = 10 + 4x$$

طبق فرض سوال:

$$\frac{bc}{b+c} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{bc}{b+c} = 2\sqrt{2} \Rightarrow x = 2\sqrt{2}$$

$$AD = \sqrt{2}x = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 4$$



(فواصل نیمسازها، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی)

(امیر مالمیر)

۳۰- گزینه «۲»

می‌دانیم هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است یعنی

ΔBDE ، طبق قضیه فیثاغورس در مثلث قائم‌الزاویه داریم: $DH = DE = 3$

$$BD^2 = DE^2 + BE^2 \Rightarrow 6^2 = 3^2 + BE^2 \Rightarrow BE = 3\sqrt{3}$$


چون $BD = AD = 6$ است و می‌دانیم هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره‌خط از

دو سر آن به یک فاصله است، پس نقطه D محل تقاطع نیمساز زاویه B و

عمودمنصف پاره‌خط AB است و چون $BE = 3\sqrt{3}$ است، AE نیز $3\sqrt{3}$

می‌شود، یعنی:


$$AB = BE + AE = 2(3\sqrt{3}) = 6\sqrt{3}$$



(ترسیم‌های هندسی و استرلال، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴ کتاب درسی)

$$10 < 4x < 20 \xrightarrow{+10} 20 < 4x + 10 < 30$$

در بین گزینه‌ها فقط ۲۴ در این بازه قرار دارد.



(ترسیم‌های هندسی و استرلال، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب درسی)

۲۹- گزینه «۱»

(پدرام قلعه‌شاقانی)

در شکل زیر AD نیمساز است، می‌دانیم که فاصله هر نقطه روی نیمساز تا دو ضلع

زاویه با هم برابر است لذا $DH = DH' = x$

چون از D بر AC عمود کرده‌ایم پس $\angle DHA = 90^\circ$ و از آنجایی که AD

نیمساز است، پس $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = 45^\circ$

مثلث ADH قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است، پس با فرض $AH = x$ داریم:

$$AD^2 = AH^2 + DH^2 = 2x^2 \Rightarrow AD = \sqrt{2}x$$

مطابق شکل مشخص است که:

$$S_{ABC} = S_{ADC} + S_{ADB}$$

$$\frac{bc}{2} = \frac{bx}{2} + \frac{cx}{2}$$

$$bc = x(b+c)$$

$$x = \frac{bc}{b+c}$$

فیزیک (۱)

۳۱- گزینه «۱»

(معمدرضا شیروانی زاده)

هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی، باید اثرهای جزئی تر را نادیده بگیریم، نه اثرهای مهم و تعیین کننده را.

نیروی مقاومت هوا برای سقوط یک چتر باز قابل چشم پوشی نیست، همینطور برای سقوط اجسام سبک مانند برگ یا کاغذ.

(صفحه ۵ کتاب درسی)

۳۲- گزینه «۳»

(علیرضا رستم زاده)

ترتیب ارائه مدل های اتمی در طول زمان، مطابق زیر است:

مدل توپ بیلیارد (توسط دالتون) ← مدل کیک کشمش (توسط تامسون) ← مدل هسته ای (توسط رادرفورد) ← مدل سیاره ای (توسط بور) ← مدل ابر الکترونی (توسط شرودینگر)

(صفحه ۲ کتاب درسی)

۳۳- گزینه «۱»

(علیرضا رستم زاده)

فقط گزاره (ت) نادرست است؛ زیرا فیزیک دانان گستره وسیعی از پدیده ها را بررسی می کنند.

(صفحه ۲ کتاب درسی)

۳۴- گزینه «۲»

(معمدرضا شریفی)

$$1) 20 \text{ km} = 20 \times 10^3 \text{ m} \times \frac{1 \text{ nm}}{10^{-9} \text{ m}} = 20 \times 10^{14} \text{ nm} \quad \checkmark$$

$$2) 0.4823 \mu\text{s} = 4823 \times 10^{-6} \text{ s} \times \frac{1 \text{ Ms}}{10^6 \text{ s}} = 4823 \times 10^{-12} \text{ Ms}$$

$$3) 9 \text{ cm}^2 = 9 \text{ cm}^2 \times \frac{10^{-4} \text{ m}^2}{1 \text{ cm}^2} \times \frac{1 \text{ mm}^2}{10^{-6} \text{ m}^2} = 9 \times 10^2 \text{ mm}^2 \quad \checkmark$$

$$4) 5 \text{ m}^3 = 5 \text{ m}^3 \times \frac{1 \text{ dm}^3}{10^{-3} \text{ m}^3} = 5 \times 10^3 \text{ dm}^3 \quad \checkmark$$

(صفحه های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

۳۵- گزینه «۴»

(بهنام شاهنی)

برای بیان کمیت های برداری، افزون بر عدد و یکای مناسب، باید جهت آن هم مشخص شود.

در گزینه «۱»: بزرگی سرعت توده ذکر شده، اما اشاره ای به جهت حرکت توده نشده است.

در گزینه «۲»: بزرگی سرعت ها (تندی ها) گفته شده، اما اشاره ای به هم جهت بودن یا نبودن توپ ها نشده است.

در گزینه «۳»: با اینکه مشخص شده که نیروها در دو جهت مخالف به جسم وارد می شوند، اما بزرگی نیروها ذکر نشده است.

در گزینه «۴»: هم سرعت حرکت توپ و هم جهت حرکت آن، هر دو مشخص شده اند.

(صفحه ۶ کتاب درسی)

۳۶- گزینه «۳»

(معمدرضا عسگری)

با توجه به رابطه انرژی جنبشی می توان نتیجه گرفت که ژول برابر است با:

$$[K] = \left[\frac{1}{2} m v^2 \right] \Rightarrow [K] = [m] \times [v^2]$$

$$\Rightarrow [K] = \text{kg} \times \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

(صفحه های ۷ و ۱۱ کتاب درسی)

$$(4/86 \times 10^2) \times 10^4 = 4/86 \times 10^6 \text{ cs}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

۴۰- گزینه «۴»

(علیرضا رستم زاده)

$$\begin{aligned} 30/24 \frac{\text{cm}}{\text{هفته}} &= 30/24 \frac{\text{cm}}{\text{هفته}} \times \frac{10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \times \frac{1 \mu\text{m}}{10^{-6} \text{ m}} \times \frac{1 \text{ هفته}}{7 \text{ شبانه‌روز}} \\ &\times \frac{1 \text{ شبانه‌روز}}{24 \text{ ساعت}} \times \frac{10^{-3} \text{ s}}{3600 \text{ s}} = \frac{30/24 \times 10^{-2} \times 10^{-3} \mu\text{m}}{10^{-6} \times 7 \times 24 \times 3600 \text{ ms}} \\ &= 5 \times 10^{-4} \frac{\mu\text{m}}{\text{ms}} \end{aligned}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

فیزیک (۱) - سوالات آشنا

۴۱- گزینه «۳»

(کتاب آبی)

با توجه به سطح مقطع کاغذ، نیروهای مقاومت هوا و وزش نسیم، اثر قابل توجهی بر روی حرکت کاغذ دارند و نمی‌توان از آنها صرف‌نظر کرد یا کاغذ را به صورت یک جسم نقطه‌ای فرض کرد. از طرفی به دلیل جرم کم کاغذ، می‌توان از تغییر وزن آن با تغییر فاصله از مرکز زمین صرف‌نظر کرد.

(صفحه ۵ کتاب درسی)

۴۲- گزینه «۴»

(کتاب آبی)

با بررسی تک‌تک گزینه‌ها داریم:

$$\text{گزینه «۱»}: \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times \frac{\text{kg}}{\text{m.s}^2}}{\frac{\text{kg}^2}{\text{s}^4}} = \frac{\text{kg}^2}{\text{s}^4} \equiv \frac{(\text{جرم})^2}{(\text{زمان})^4}$$

۳۷- گزینه «۳»

(پونام شاهینی)

شدت روشنایی در دستگاه اندازه‌گیری SI، یک کمیت اصلی و نرده‌ای است. یعنی علاوه بر عدد، دارای یکا نیز هست.

(صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب درسی)

۳۸- گزینه «۲»

(سیره ملیحه میرصالحی)

با توجه به این که مساحت مثلث برحسب یکای سانتی‌متر مربع خواسته شده، لازم است در ابتدا همه ابعاد شکل به یکای سانتی‌متر تبدیل شوند. با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$\text{ارتفاع مثلث } h = 15 \text{ mm}$$

$$= 15 \text{ mm} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ mm}} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} = 1/5 \text{ cm}$$

$$\text{قاعده مثلث } a = 10^2 \text{ hm}$$

$$= 10^2 \text{ hm} \times \frac{10^2 \text{ m}}{1 \text{ hm}} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} = 10^6 \text{ cm}$$

در نتیجه مساحت مثلث برابر خواهد بود با:

$$S = \frac{1}{2} (a \times h) = \frac{1}{2} (1/5 \times 10^6) = 7/5 \times 10^5 \text{ cm}^2$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

۳۹- گزینه «۴»

(علیرضا رستم زاده)

زمان بین طلوع و غروب خورشید ۱۳/۵ ساعت است که آن را با استفاده از تبدیل زنجیره‌ای به سانتی‌ثانیه تبدیل می‌کنیم:

$$13/5 \text{ h} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \times \frac{1 \text{ cs}}{10^{-2} \text{ s}} = 486 \times 10^4 \text{ cs}$$

و در نهایت آن را به صورت نمادگذاری علمی می‌نویسیم:

حجم مکعب تعداد مکعب‌های کوچک را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} \text{حجم مکعب کوچک} &= 4 \times 10^{-2} \times 6 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-1} \\ &= 48 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{حجم جعبه} = 4 \times 10 \times 6 \times 4 \times 10 = 96 \times 10^2 \text{ m}^3$$

$$\frac{\text{حجم جعبه}}{\text{حجم مکعب‌ها}} = \text{تعداد مکعب‌های کوچک}$$

$$= \frac{96 \times 10^2}{48 \times 10^{-5}} = 2 \times 10^7 \text{ مکعب}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۵- گزینه «۲»

با توجه به گزینه‌ها، ابتدا هر یک از عبارت‌های داده شده را بر حسب میلی‌متر مربع به دست می‌آوریم:

$$3 \times 10^6 \mu\text{m}^2 = 3 \times 10^6 \times (10^{-3} \text{ mm})^2$$

$$\Rightarrow 3 \times 10^6 \mu\text{m}^2 = 3 \times 10^6 \times 10^{-6} \text{ mm}^2 = 3 \text{ mm}^2$$

$$4 \text{ cm}^2 = 4 \times (10 \text{ mm})^2 = 400 \text{ mm}^2$$

$$4 \times 10^{-3} \text{ dm}^2 = 4 \times 10^{-3} \times (100 \text{ mm})^2 = 40 \text{ mm}^2$$

به این ترتیب حاصل عبارت فوق برابر است با:

$$3 + 400 + 40 = 443 \text{ mm}^2$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۶- گزینه «۱»

ابتدا جرم مایع موجود در مخزن را به دست می‌آوریم:

$$\text{گزینه «۲»}: \frac{\text{نیرو}}{\text{انرژی}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = \frac{1}{\text{m}} \equiv (\text{طول})^{-1}$$

$$\text{گزینه «۳»}: \frac{\text{جرم}}{(\text{زمان})^3} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} \equiv \text{سرعت} \times \text{فشار}$$

$$\text{گزینه «۴»}: \frac{\text{انرژی}}{\text{توان}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^3}} = \text{s} \equiv \text{زمان}$$

(صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۳- گزینه «۲»

یکاهای تعریف شده برای یک کمیت باید به گونه‌ای انتخاب شوند که تغییرناپذیر باشند و قابلیت باز تولید داشته باشند. وجب دست با وجود این که یکای در دسترسی است، ولی تغییرناپذیر نیست و از شخصی به شخص دیگر تغییر خواهد کرد.

(صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۴- گزینه «۲»

ابتدا تمامی ابعاد را یکسان‌سازی می‌کنیم:

$$\text{ابعاد مکعب کوچک} : \begin{cases} 4 \text{ cm} = 4 \times 10^{-2} \text{ m} \\ 60 \text{ mm} = 60 \times 10^{-3} \text{ m} = 6 \times 10^{-2} \text{ m} \\ 2 \text{ dm} = 2 \times 10^{-1} \text{ m} \end{cases}$$

$$\text{ابعاد جعبه} : \begin{cases} 0.4 \text{ hm} = 0.4 \times 10^2 \text{ m} = 4 \times 10^1 \text{ m} \\ 0.6 \text{ dam} = 0.6 \times 10^1 \text{ m} = 6 \text{ m} \\ 4 \times 10^{-5} \text{ Mm} = 4 \times 10^{-5} \times 10^6 \text{ m} = 4 \times 10^1 \text{ m} \end{cases}$$

سپس حجم مکعب کوچک و جعبه را محاسبه کرده و با تقسیم کردن حجم جعبه بر

(کتاب آبی)

۴۹- گزینه «۱»

$$[b] = kN = 10^3 N = 10^3 \frac{kg \cdot m}{s^2}$$

$$[c] = MPa = 10^6 Pa = 10^6 \frac{kg}{m \cdot s^2}$$

$$[d] = GJ = 10^9 J = 10^9 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$$

$$\frac{a = \frac{b^2 c}{d^2} \rightarrow [a] = \frac{10^9 \frac{kg^2 \cdot m^2}{s^4} \times 10^6 \frac{kg}{m \cdot s^2}}{10^{18} \frac{kg^2 \cdot m^2}{s^4}}$$

$$\Rightarrow [a] = \frac{10^{15}}{10^{18}} \times \frac{kg^2 \cdot m^2}{s^4} = 10^{-3} \frac{kg^2}{s^4 \cdot m^2}$$

$$\frac{Pa = \frac{kg}{m \cdot s^2}}{\rightarrow [a] = 10^{-3} Pa^2}$$

(صفحه‌های ۷ و ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۵۰- گزینه «۲»

یکای هر کمیت فرعی را با استفاده از رابطه یا رابطه‌های آن کمیت با کمیت‌های

اصلی و یا با کمیت‌های فرعی دیگر می‌توان تعریف کرد و برای آن‌ها یکای مستقلی

تعریف نمی‌شود.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

$$m_{\text{مایع}} = \rho V \quad \rho = 2500 \frac{kg}{m^3} = 2/5 \frac{g}{cm^3} \rightarrow V = 2 \times 3 \times 5 = 30 cm^3$$

$$m_{\text{مایع}} = 2/5 \times 30 = 75g$$

$$\text{آهنگ خروج} = \frac{m}{t} = \frac{\text{جرم مایع}}{\text{مدت زمان خروج}} \Rightarrow \frac{5 \times 10^{-1} g}{60s} = \frac{75}{t} g$$

$$\Rightarrow t = \frac{45 \times 10^3}{5} = 9 \times 10^3 s$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۷- گزینه «۴»

$$0/00000101 = 1/01 \times 10^{-6}$$

سایر گزینه‌ها برحسب نمادگذاری علمی به درستی نوشته شده‌اند.

(صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ کتاب درسی)

(کتاب آبی)

۴۸- گزینه «۴»

T پیشوند ترا است که معادل با 10^{12} می‌باشد، بنابراین:

$$125 Tm = 125 \times 10^{12} m$$

هر میکرومتر، برابر با 10^{-6} متر است ($1 \mu m = 10^{-6} m$)، به عبارت دیگر

$10^{+6} \mu m$ برابر با یک متر است.

$$(1m = 10^{+6} \mu m)$$

بنابراین:

$$125 \times 10^{12} m = 125 \times 10^{12} \times 10^6 \mu m$$

$$= 125 \times 10^{18} \mu m = 1/25 \times 10^{20} \mu m$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

شیمی (۱)

۵۱- گزینه «۳»

«پرواز تقی زاده»

سؤال «هستی چگونه پدید آمده است؟» پرسشی بسیار بزرگ و بنیادی است و در قلمرو علوم تجربی نمی گنجد و آدمی تنها با مراجعه به چارچوب اعتقادی و بینش خود و در پرتو آموزه‌های الهی می‌تواند به پاسخی جامع دست یابد. علوم تجربی برای یافتن پاسخ سؤال‌های «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟» و «پدیده‌های طبیعی چرا و چگونه رخ می‌دهند؟» تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است و این تلاش‌ها دانش ما درباره جهان مادی را افزایش داده است.

(صفحه ۲ کتاب درسی)

۵۲- گزینه «۳»

«مفهم عمیری»

موارد اول و سوم در ایزوتوپ‌ها مشابه‌اند. در ایزوتوپ‌ها شمار الکترون‌ها و پروتون‌ها یکسان و شمار نوترون‌ها متفاوت است؛ در نتیجه، خواص شیمیایی مشابه و خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوتی دارند.

(صفحه ۵ کتاب درسی)

۵۳- گزینه «۴»

«علی پعفری»

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب (مهبانگ) همراه بود که در اثر آزاد شدن انرژی زیاد، ابتدا ذرات زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون به وجود آمدند. گزینه «۲»: عنصرها به صورت ناهمگون در جهان هستی توزیع شده‌اند. به عنوان مثال نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری متفاوت است. گزینه «۳»: در واکنش‌های شیمیایی که در پدیده‌های طبیعی پیرامون ما در زندگی روزانه رخ می‌دهند، مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر از انرژی آزاد شده در واکنش‌های هسته‌ای است.

(صفحه ۴ کتاب درسی)

۵۴- گزینه «۱»

«علی پعفری»

اندازه یون حاوی تک‌نسیم، مشابه اندازه یون یدید (I^-) است.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

۵۵- گزینه «۱»

«ایمان حسین نژاد»

این فضاپیماها با گذر از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را تهیه کردند.

(صفحه ۲ کتاب درسی)

۵۶- گزینه «۳»

«سیار مپاهر»

موارد (ب) و (پ) نادرست هستند.

بررسی موارد نادرست:

(ب) درون ستاره‌ها همانند خورشید واکنش هسته‌ای رخ می‌دهد.

(پ) درصد فراوانی اکسیژن در زمین بیشتر از مشتری است.

(صفحه‌های ۲ تا ۴ کتاب درسی)

۵۷- گزینه «۲»

«امیر فاطمیان»

$^{99}_{43}\text{Tc}$ ایزوتوبی با نیم‌عمر کم و ماندگاری کم است که نگهداری آن دشوار است. برای تولید تک‌نسیم نیاز به واکنش‌های هسته‌ای داریم. یون یدید با یون حاوی تک‌نسیم اندازه مشابهی دارد نه با یون تک‌نسیم.

(صفحه ۷ کتاب درسی)

۵۸- گزینه «۲»

«مفهم عمیری»

موارد (الف) و (ت) درست است.

برخی دانشمندان بر این باورند که پیدایش جهان با یک انفجار مهیب (مهبانگ) همراه بوده است.

سحابی → هلیوم → هیدروژن → پیدایش ذره‌های زیراتمی (n, p, e) → مهبانگ

سحابی‌ها، مجموعه‌های گازی متراکم هستند که ستاره‌ها در درون آن‌ها شکل می‌گیرد.

مرگ ستاره‌ها همراه با یک انفجار بزرگ است و در نتیجه آن عنصرهای سازنده ستاره در فضا پراکنده می‌شود.

(صفحه ۴ کتاب درسی)

۵۹- گزینه «۴»

«علی یغفری»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اکسیژن و گوگرد در دو سیاره مشتری و زمین به‌طور مشترک یافت می‌شوند.

گزینه «۲»: عناصر نئون، آرگون و هلیوم که از گازهای نجیب هستند، در هشت عنصر فراوان سیاره مشتری می‌باشند اما در بین ۸ عنصر فراوان سیاره زمین هیچ گاز نجیبی یافت نمی‌شود.

گزینه «۳»: فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری، هیدروژن است که دارای ۳ ایزوتوپ طبیعی (${}^1\text{H}$ ، ${}^2\text{H}$ و ${}^3\text{H}$) است.

گزینه «۴»: در میان هشت عنصر فراوان سیاره زمین تنها عنصر اکسیژن در دما و فشار اتاق در حالت گازی است.

(صفحه‌های ۳ و ۶ کتاب درسی)

۶۰- گزینه «۲»

«شهرام امیرمعموری»

بررسی عبارت‌های نادرست:

مورد اول: اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون به عدد اتمی (پروتون) آن‌ها برابر یا بیش از ۱/۵ باشد ناپایدار می‌باشند.

مورد دوم: حدود ۷۸٪ عناصر شناخته شده در طبیعت وجود دارند.

$$\frac{92}{118} \times 100 \approx 78\%$$

(صفحه‌های ۵ تا ۸ کتاب درسی)

۶۱- گزینه «۳»

«هاری زمانیان»

تنها عبارت (الف) نادرست است.

بررسی برخی عبارت‌ها:

(الف) پس از مه‌بانگ و پدید آمدن ذره‌های زیراتمی، با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شده متراکم شدند و سحابی را به وجود آوردند.

(ب) به واکنش‌هایی که در آن‌ها از عناصر سبک‌تر، عناصر سنگین‌تر به‌وجود می‌آید، واکنش هسته‌ای گویند.

(صفحه ۴ کتاب درسی)

۶۲- گزینه «۳»

«امیر فاطمیان»

همه عبارت‌ها، جمله را به‌درستی تکمیل می‌کنند.

(الف) در گروه هجده جدول ۷ عنصر و در گروه دوم جدول ۶ عنصر قرار دارد.

(ب) دوره دوم و سوم هر یک دارای ۸ عنصر و دوره اول دارای ۲ عنصر است.

(پ) با توجه به جدول دوره‌ای عناصر ${}^{74}\text{Se}$ و ${}^{39}\text{K}$ در دوره چهارم و عناصر ${}^{20}\text{Ca}$ و ${}^4\text{Be}$ در گروه دوم قرار دارند.

(صفحه‌های ۹ تا ۱۲ کتاب درسی)

۶۳- گزینه «۴»

«سهراب هادقی‌زاده»

بررسی موارد:

(الف) خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرهای هر ستون عمودی مشابه است، ولی خواص فیزیکی این عنصرها الزاماً یکسان نمی‌باشد. (درست)

(ب) در هر خانه از جدول تناوبی، جرم اتمی میانگین عنصرها گزارش می‌شود. (نادرست)

(پ) در عنصری مانند ${}^1\text{H}$ ، تعداد نوترون‌ها کمتر از تعداد پروتون‌ها است. (نادرست)

(ت) نماد شیمیایی عنصر منیزیم به‌صورت Mg است. (نادرست)

(صفحه‌های ۵ و ۹ تا ۱۳ کتاب درسی)

۶۴- گزینه «۲»

«پرهام رمضانی»

در ابتدا فرض می‌کنیم تعداد الکترون‌ها برابر X می‌باشد؛ به همین دلیل، تعداد پروتون‌ها $X+2$ می‌باشد. ۴۸ درصد ذرات باردار مربوط به الکترون‌ها می‌باشد، پس:

$$\frac{e}{e+e+2} \times 100 = 48 \Rightarrow e = 24$$

حال $37/5$ درصد کل ذرات زیراتمی (یعنی پروتون، نوترون و الکترون) مربوط به نوترون‌ها می‌باشد، پس:

$$\frac{n}{24+24+n} \times 100 = 37/5 \Rightarrow n = 30$$

تفاوت تعداد الکترون‌ها و نوترون‌ها در این یون ۶ می‌باشد.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

۶۵- گزینه «۴»

«امیر فاطمیان»

همه عبارت‌ها صحیح هستند.

(صفحه ۹ کتاب درسی)



$$[7,7] \begin{bmatrix} 6,6 \\ 6,7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5,5 \\ 5,6 \\ 5,7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4,4 \\ 4,5 \\ 4,6 \\ 4,7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3,3 \\ 3,4 \\ 3,5 \\ 3,6 \\ 3,7 \end{bmatrix}$$

در نتیجه ۱۵ نوع مولکول آب می‌توان تشکیل داد.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب درسی)

«یاسر علیشانی»

۶۹- گزینه ۳»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: «A» عنصر B که در گروه گازهای نجیب است برخلاف عنصر A تمایل به انجام واکنش ندارد.

گزینه ۲: «D» عنصر در دوره دوم و گروه هفدهم جدول قرار دارد. عنصر ${}^4\text{Be}$ در دوره دوم و عنصر ${}^{34}\text{Se}$ در گروه شانزدهم جدول قرار دارد.

$$\begin{cases} n+p=45 \\ n-p=3 \end{cases} \Rightarrow 2n=48 \Rightarrow n=24, p=21$$

گزینه ۳: «F»

گزینه ۴: «F» جدول براساس افزایش عدد اتمی چیده شده است، پس اعداد اتمی F و E به ترتیب برابر ۶ و ۲۸ است که اختلاف آن‌ها برابر ۲۲ است.

(صفحه‌های ۵، ۶ و ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

«یاسر علیشانی»

۷۰- گزینه ۴»

بررسی گزینه‌ها:

$$n+e+p=49 \quad (I)$$

$$\begin{cases} n-p=1 \\ e-n=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p=n-1 \\ e=n+2 \end{cases} \Rightarrow \text{جایگذاری در رابطه (I)}$$

$$n+n+2+n-1=49 \Rightarrow n=16, e=n+2=16+2=18$$

گزینه ۱: «A» با توجه به ذرات زیراتمی گونه داده شده آنیون ${}^{31}\text{P}^{3-}$ است.

گزینه ۲: «B» با توجه به تعداد $n=16$ و $p=15$ ، اختلاف آن‌ها یک واحد است و تعداد نوترون‌ها بیشتر است.

گزینه ۳: «C» چون ${}^{39}\text{X}$ ایزوتوپ گونه داده شده است، پس نماد آن به صورت

$${}^{39}\text{X}_{15} \text{ است که } \frac{N}{Z} \geq 1/5 \text{ است، پس یک رادیوایزوتوپ است.}$$

$$\frac{24}{15} = 1/6 \Rightarrow 1/6 > 1/5$$

گزینه ۴: «D» گونه داده شده فسفر با نماد شیمیایی تک حرفی (P) در جدول تناوبی است.

(صفحه‌های ۵، ۶ و ۹ تا ۱۳ کتاب درسی)

۶۶- گزینه ۴»

«امیر خاتمیان»

$$\begin{cases} m \rightarrow \text{مقدار ماده پرتوزای باقی مانده} \\ m_0 \rightarrow \text{مقدار ماده پرتوزای اولیه} \\ T \rightarrow \text{زمان کل واپاشی} \\ t \left(\frac{1}{2}\right) \rightarrow \text{زمان نیم عمر} \end{cases} \Rightarrow \frac{m_0}{m} = 2^{\frac{t}{T}}$$

با توجه به اینکه فرایند متلاشی شدن هسته تا تمام شدن جرم ماده پرتوزا ادامه می‌یابد می‌توان دریافت که جرم ماده پرتوزای اولیه برابر $3/2$ گرم بوده است. همچنین با توجه به نمودار در مدت زمان ۱۸ ساعت $2/8$ گرم ماده واپاشیده شده است، پس جرم ماده پرتوزای باقی مانده برابر $0/4$ گرم است.

ابتدا نیم عمر را حساب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{m_0}{m} &= 3/2 \\ \frac{3/2}{0/4} &= 2^{\frac{t}{T}} \Rightarrow 3 = 2^{\frac{18}{T}} \Rightarrow \frac{18}{T} = \log_2 3 \Rightarrow T = 18 \text{ ساعت} \\ \frac{m}{m_0} &= \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{m}{m_0} = \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}} = \frac{1}{2^{\frac{18}{T}}} = \frac{1}{2^6} \end{aligned}$$

(صفحه ۶ کتاب درسی)


«امیر خاتمیان»

۶۷- گزینه ۲»

موارد (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی برخی عبارت‌ها:

(ب) شکل صحیح پایداری ایزوتوپ‌های هیدروژن:



(پ) ایزوتوبی که کمترین نیم عمر را دارد (${}^7\text{H}$) از سایر ایزوتوپ‌ها ناپایدارتر است.
(ت) به ترتیب ۴ و ۵ ایزوتوپ از ایزوتوپ‌های هیدروژن ساختگی و رادیوایزوتوپ هستند.

(صفحه ۶ کتاب درسی)

«مرتضی زارعی»

۶۸- گزینه ۱»

در بین مولکول‌های آب قابل تشکیل از ۷ ایزوتوپ H و ۳ ایزوتوپ O باید حداقل ۲ اتم باشد که رادیوایزوتوپ هستند.

$$\begin{cases} P < 84 \\ \frac{N}{P} < 1/5 \end{cases} \Rightarrow \text{همگی پایدار هستند}$$

ایزوتوپ‌های اکسیژن تماماً پایدار هستند چون شرایط ناپایداری را ندارند، پس آن ۲ اتم باید از ایزوتوپ‌های هیدروژن باشند که از ۷ ایزوتوپ H، ۵ عدد ناپایدار هستند.



آدرس وب سایت ما

novinkonkor.com

نوین کنکور

در شبکه های اجتماعی



novinkonkor



@novinkonkor



۰۹۳۸۲۵۱۶۷۴۷

نوین کنکور مرجع کنکور و امتحان نهایی